

(10)

Chi-SquareDate
Page

$\chi^2 = (\text{Chi-Square})$ का महत्वपूर्ण उपयोग Contingency table में Independence hypothesis की जांच करना।

Independence hypothesis में χ^2 पर Null hypothesis के रूप में उपयोग होता है। Independence hypothesis का अर्थ होता है कि दो variables या traits आपस में असंबंधित हैं, अर्थात् Independent हैं। χ^2 के द्वारा यह बात की जांच की जाती है कि वास्तव में दोनो variables आपस में स्वतंत्र हैं या नहीं। अर्थात् χ^2 का उपयोग स्वतंत्रता प्राक्कल्पना की वास्तविकता की जांच के लिए किया जाता है। यदि Chi-Square सार्थक होता जाता है तो Independence hypothesis अस्वीकृत कर दिया जाता है। और यह कहा जाता है कि वास्तव में दोनो पर आपस में संबंधित हैं। इसके विपरीत यदि Chi-Square सार्थक नहीं होता है तो Independent hypothesis को स्वीकार कर लिया जाता है। एक उदाहरण द्वारा Independent hypothesis के Chi-Square द्वारा जांच कर सकता जा सकता है -

एक बुद्धि परीक्षण class I से class V तक के कुल 240 छात्रों को दिया गया। इन छात्रों में से class I के 56, class II के 46, class III के 51, class IV के 55 तथा class V के 32 छात्र थे। इन छात्रों को बुद्धि मापक के आधार पर observed frequency नीचे table में दिये गये हैं।

अब हमें यह बताना है कि क्या बुद्धि और कक्षा (class) आपस में स्वतंत्र हैं?

	class					
	I	II	III	IV	V	
110-119	19	11	24	30	18	102
100-109	09	12	19	16	08	64
90-99	09	11	04	05	04	33
80-89	19	12	04	04	02	41
	56	46	51	55	32	240

के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करें -
Chi-Square जांच करें

$$\chi^2 = \sum \left\{ \frac{(O - E)^2}{E} \right\}$$

70. हमें ज्ञात है स्वप्रयत्न हम 70 ज्ञात
 करेंगे। जिस 70 का 70 ज्ञात करना है
 उसके पहिले ओर तथा नीचे के भाग को
 गुणा कर छात्रों के कुल संख्या से भाग देने
 पर 70 ज्ञात होगा। उदाहरण स्वप्रयत्न class I
 के छात्रों में 110-119 class interval पर 19
 छात्र है जो 19 को गुणा 110-119 class interval
 में कुल 102 छात्र आते है तथा class I के
 कुल छात्रों की संख्या 56 है। पर 102 को
 56 से गुणा कर छात्रों की कुल संख्या 240 से
 भाग देने पर 70 ज्ञात होगा। इस प्रकार 70
 पर सभी का 70 ज्ञात करेंगे।

70	70-70	$(70-70)^2$	$\frac{(70-70)^2}{f}$
$\frac{56 \times 102}{240} = 23.8$	-4.8	23.04	.968
$\frac{56 \times 64}{240} = 14.93$	-5.93	35.165	2.355
$\frac{56 \times 33}{240} = 7.7$	1.3	.007	.001
$\frac{56 \times 41}{240} = 9.56$	9.44	89.11	9.32
$\frac{56 \times 102}{240} = 19.55$	8.55	73.102	3.75

\bar{z}_e	$\bar{z}_0 - \bar{z}_e$	$(\bar{z}_0 - \bar{z}_e)$	$\frac{(\bar{z}_0 - \bar{z}_e)^2}{\bar{z}_e}$
$\frac{46 \times 64}{240} = 12.26$	- .26	.067	.0003
$\frac{46 \times 33}{240} = 6.325$	4.65	21.622	3.418
$\frac{46 \times 41}{240} = 7.085$	4.91	24.088	3.356
$\frac{51 \times 102}{240} = 21.675$	2.325	5.406	.249
$\frac{51 \times 64}{240} = 13.6$	5.4	29.16	2.144
$\frac{51 \times 33}{240} = 7.013$	-3.013	9.078	1.294
$\frac{51 \times 41}{240} = 8.712$	-4.712	22.202	2.548
$\frac{55 \times 102}{240} = 23.375$	6.625	43.89	1.877
$\frac{55 \times 64}{240} = 14.667$	1.33	1.768	.120
$\frac{55 \times 33}{240} = 7.562$	-2.52	6.563	.867
$\frac{55 \times 41}{240} = 9.395$	-5.395	29.106	3.098

\bar{x}_c	$\bar{x}_r - \bar{x}_c$	$(\bar{x}_r - \bar{x}_c)^2$	$\frac{(\bar{x}_r - \bar{x}_c)^2}{\bar{x}_c}$
$\frac{32 \times 102}{240} = 13.6$	4.4	19.36	1.42
$\frac{32 \times 64}{240} = 8.53$.53	.281	.033
$\frac{32 \times 33}{240} = 4.4$.4	.16	.036
$\frac{32 \times 41}{240} = 5.466$	3.466	12.013	2.197
			<u>39.0923</u>
		$\chi^2 = 39.09$	

$df = (r-1)(c-1) = (4-1)(5-1) = 3 \times 4 = 12$
 अब χ^2 की सारफ़िकता की जाँच के लिए χ^2 table पर देखेंगे। $df = 12$ पर देखने से पता चलता है कि χ^2 को .01 level पर सारफ़िक होने के लिए 32.909 चाहिए प्राप्त $\chi^2 = 39.09$ है जो 32.909 से ज्यादा है। अतः यहाँ Independence hypothesis अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात्, निरक्षर स्वभाव यह समझें हैं कि लड़के नंबा करण से संबंधित हैं स्वतंत्र नहीं।

Dr. Om Prakash Prakash
 Dept. of Psychology
 Maharaja College
 ARA.