

(11)

# Chi-Square

जब कोई आकड़ा class interval तथा frequency में बरामदा जाता है तो normal distribution की जांच chi-square द्वारा करेंगे। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है -

अनालया जाय 30 व्यक्तियों को randomly चुन कर उन पर व्यक्ति परीक्षण किया गया। हमें देखा है कि जो data प्राप्त हुए है वे normally distributed population से randomly ली गयी है अथवा नहीं। इसके लिए हमें जरूर जांच करना होगा और जरूर जांच करने के लिए mean और S.D. की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे लिये प्रथम हम mean और S.D. जांच करेंगे। - पाठ आकड़े इस प्रकार है।

class interval	frequency	$x'$	$f x'$	$f x'^2$
90 - 94	1	4	4	16
85 - 89	2	3	6	18
80 - 84	1	2	2	4
75 - 79	4	1	4	4
70 - 74	8	0	0	0
65 - 69	7	-1	-7	7
60 - 64	3	-2	-6	12
55 - 59	2	-3	-6	18
50 - 54	1	-4	-4	16
45 - 49	1	-5	-5	25
			<u>-12</u>	<u>120</u>



$$\begin{aligned}
 \text{Mean} &= AM + \frac{\sum fx^1}{N} \times x_i \\
 &= 72 + \left(\frac{-12}{30}\right) \times 5 \\
 &= 72 + (-4) \times 5 \\
 &= 72 + (-2) \\
 &= 70
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \sqrt{\frac{\sum fx^1^2}{N} - \left(\frac{\sum fx^1}{N}\right)^2} \\
 &= 5 \sqrt{\frac{120}{30} - \left(\frac{-12}{30}\right)^2} \\
 &= 5 \sqrt{4 - (-4)^2} \\
 &= 5 \sqrt{4 - 1.16} \\
 &= 5 \sqrt{2.4} \\
 &= 5 \times 1.549 \\
 &= 7.75
 \end{aligned}$$

सर्व data का Mean = 70

अतः  $\sigma = 7.75$  अर्थात्  $\sigma$  का मान 7.75 है।



(3)

(1) ci	(2) f	(3) Upper Limit	(4) Deviation $X-M$	(5) Z-Score $\frac{X-M}{\sigma}$	(6) Cumulative Proportion	(7) Cumulative Frequency (PXM)
90-94	1	94.5	24.5	3.16	.9992	29.98
85-89	2	89.5	19.5	2.52	.9942	29.83
80-84	1	84.5	14.5	1.87	.9693	29.08
75-79	4	79.5	9.5	1.22	.8888	26.66
70-74	8	74.5	4.5	.58	.7190	21.57
65-69	7	69.5	- .5	- .06	.4761	14.28
60-64	3	64.5	- 5.5	- .71	.2389	7.17
55-59	2	59.5	-10.5	-1.35	.0885	2.65
50-54	1	54.5	-15.5	-2.00	.0228	.68
45-49	1	49.5	-20.5	-2.64	.0041	.12

$N = 30$  Mean = 70,  $\sigma = 7.75$

(7) fe	(8) fo	(9) fo-fe	(10) $(fo-fe)^2$	(11) $\frac{(fo-fe)^2}{fe}$
0.15				
0.75				
2.42	4	<del>0.08</del>	<del>0.562</del>	<del>0.139</del>
5.09	8	- 0.41	<del>1.68</del> .168	<del>0.208</del> = 0.199
7.29	8	.71	0.504	0.069
7.11	7	- .11	0.012	0.001
4.52	7	- .17	0.029	0.004
1.97				<del>0.446</del> = .0894
0.56			$\chi^2 = \frac{1.68}{45}$	$\chi^2 = .0939$
0.12				

df = No of categories - 3

~~4-3 = 1~~     4-3 = 1



Mean एवं S.D. निकालने के बाद प्रत्येक class interval के upper limit और कर कालम 3 में लिखा गया है। प्रत्येक upper limit को प्राप्त mean जो 70 है से deviation और दिया जाता है अर्थात् upper limit (X) को mean में घटाकर कालम 4 में लिखा गया है। कालम 4 में जो  $X - M$  आया उसे standard deviation जो 7.75 है से भाग देकर Z-Score और दिया गया जिसे कालम 5 में दिखाया गया है।

Z-table के आधार पर cumulative proportion और दिया जाता है, जैसे class interval 80-84 में Z-Score = 1.87 है Z-table larger area .9693 है तथा class interval 55-59 में Z-Score -1.35 smaller area .0885 है। अर्थात् यदि Z-Score ऋण (minus) में आता है तो उसे smaller area में देखने की इस प्रकार Z-Score से cumulative proportion और कर कालम 6 में लिखा गया है। Cumulative proportion और करने के बाद cumulative frequency और दिया गया है। यहाँ cumulative frequency और करने के लिए cumulative proportion को  $N$  जो 30 है उससे गुणा किया गया। जैसे class interval 80-84 का cumulative proportion .9693 है इसे  $N = 30$  से गुणा करने पर



गुणनफल 29.08 आता है। Cumulative frequency वाली कालम 7 में लिख लिखा गया। इस प्रकार सभी class interval का Cumulative frequency ज्ञात किया गया। Cumulative frequency के आधार पर expected frequency ज्ञात किया जाता है, इसके लिए पहले Cumulative frequency में अनुक्रमित पंक्ति के लिए expected frequency ज्ञात किया गया है जैसे- 29.98 में से 29.83 पंक्ति पर 0.15 आता जो class interval 90-94 का expected frequency (fe) हुआ। इस प्रकार सभी class interval का fe ज्ञात कर कालम 8 में लिख लिखा गया। अंतिम class interval का expected frequency नहीं होता है जो Cumulative frequency होता है। fe ज्ञात होने के बाद अब  $\chi^2$  ज्ञात किया गया।

अब यहाँ  $\chi^2$  ज्ञात करने के लिए जो fe ज्ञात हुआ है उसमें उपर के 4 class interval के fe को जोड़ दिया गया जो 5 से अधिक अर्थात् 8.41 होता है। जिस class interval के fe को एक साथ जोड़ा जाता है उस class interval के fe को भी एक साथ जोड़ दिया जाता है। यानी के 4 class interval के fe को जोड़ने पर 7.17 आता तथा इसके fe को जोड़ने पर 7 आता। अब निम्न सूत्र के आधार पर



$\chi^2$  मान किमा -

$$\chi^2 = \sum \left\{ \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \right\}$$

आइ  $\chi^2 = .0939$  तथा  $df = 1$  है। इसमें कुल 10 class interval में जिसमें उपर के चार और नीचे के चार class interval को एक साथ मिला दिया गया। इस तरह 4 class interval हुए उपर-नीचे के एक-एक तथा बीच के दो। यहाँ  $df$  निम्न सूत्र से ज्ञात किमा गया है जो इस प्रकार है -

No categories - 3 अर्थात्  $df = 1$  आता है।  $df = 1$  पर  $\chi^2$  को सार्थक होने के लिए .05 level पर 3.841 होना चाहिए आइ  $\chi^2$  कम है जो सार्थक नहीं है। अर्थात् ~~मान~~ normal distribution hypothesis स्वीकृत होता है। अतः यह frequency distribution normally distributed है।

Dr. Om Prakash Kashin  
Deptt of Psychology  
Maharaja College, ARA.